

# 20 de **pasto** a 20 **leche**



**PRIMAVERA - VERANO 2017**

**Coeficientes técnicos en la implantación de pasturas y cultivos  
Verdeos y Cultivos de Verano.**


**Mario Fossatti  
Lorena Román  
Carolina Barrios**

## Qué enviaron?


- Fecha de inicio del barbecho
- Fecha de siembra
- Tipo de siembra (convencional o directa)
- Densidad de siembra
- Fertilización (presiembra – siembra – cultivo)
- Uso de herbicidas (barbecho – preemergencia – postemergencia)



# Duración del barbecho (días)



# Rango de fechas de siembra




# Tipo de laboreo y densidad de siembra


	Número de chacras	Chacras con laboreo convencional (%)	Densidades de siembra (kg/ha)		
			Promedio	Máximo	Mínimo
Maíz grano	5	80%	25	25	25
Maíz silo	22		25	25	20
Sudan	20		26	30	20
Sorgo Forrajero	48	4%	23	25	15
Sorgo Silo	15		10	12	8
Sorgo grano	4		13	14	12




## Fertilización total según nutriente




# Fertilización Maíz grano (kg de nutriente)




# Fertilización Maíz silo (kg de nutriente)




# Fertilización Sorgo silo (kg de nutriente)




# Fertilización Sorgo grano (kg de nutriente)



# Fertilización Sorgo Forrajero (kg de nutriente)



# Fertilización Sudan (kg de nutriente)



# Uso de Herbicidas y control de insectos

	Glifosato (L/ha)			% de chacras c/preemergente	% de chacras control de insectos
	Promedio	Máximo	Mínimo		
Maíz grano	<b>6,2</b>	7	3	100 %	80 %
Maíz silo	<b>8</b>	14	3	57%	81 %
Sudan	<b>5</b>	10	3	68 %	
Sorgo Forrajero	<b>5</b>	10	3	91 %	
Sorgo Silo	<b>4,2</b>	6	2	100 %	
Sorgo grano	<b>4</b>	5	4	100 %	



## Reservas – Rendimiento de silos

	Promedio	Máximo	Mínimo	Número
Maíz Silo	26,886	48,000	12,777	37
Sorgo silo	28,499	45,257	2,674	23

